

1. 188

Fünf Fälle von Gelenkkörpern.

(Mittheilungen aus dem Knappschaftslazareth
des Herrn Dr. Wagner in Königshütte.)

Lane Medical Library

Inaugural-Dissertation

welche nebst beigefügten Thesen

mit Genehmigung der

medizinischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin und Chirurgie

Sonnabend, den 3. Dezember 1887, Mittags 12 Uhr

im Musiksaal der Universität

öffentlich vertheidigen wird


Wilhelm Riesenfeld,

pract. Arzt.

Opponenten:

Dr. med. **Reinhold Kreckler**, pract. Arzt,

Dr. med. **Alfred Moebis**, pract. Arzt.



Freystadt N.-Schl.

F. Pohl (vorm. G. Doeger'sche Hofbuchdr.)

Genehmigt zum Druck auf Antrag des Referenten:

Herrn Geh. Medicinal-Rath Prof. Dr. Fischer.

Herrn Dr. med. Wagner,

dirig. Arzt des Knappschafts-Lazareths in Königshütte,

in Hochachtung und Dankbarkeit

sowie

Seiner theuren Mutter

in kindlicher Liebe

gewidmet

vom Verfasser.

V o r w o r t.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle einer angenehmen Pflicht zu genügen und Herrn Dr. med. Wagner in Königshütte für die freundliche Ueberlassung des Krankenmaterials und gütige Unterstützung bei meiner Arbeit meinen tiefgefühltesten Dank auszusprechen.

Seitdem Ambroise Paré im Jahre 1558 den ersten Fall von Gelenkkörper beobachtet hatte, haben diese Gebilde die Aufmerksamkeit der Chirurgen in hohem Grade erregt.

Freilich ist die Kasuistik der früheren Jahrhunderte verhältnissmässig dürftig; nicht etwa deshalb, glaube ich, weil es an Material gebrach, sondern weil sicherlich eine grosse Zahl von Fällen wegen des unglücklichen Ausganges nicht publiciert wurde, und weil ferner, nachdem man sich überzeugt hatte, welch' schwere Erscheinungen die operative Entfernung jener Körperchen nach sich ziehen kann, man es vorzog, von ihrer Entfernung abzusehen.

In den Annalen der Chirurgie sind also solche Fälle nicht aufgeführt.

Erst in den letzten Jahren hat sich die Kasuistik der operativ entfernten „Gelenkmäuse“ erheblich vermehrt, namentlich seit man unter dem Schutze des antiseptischen Verfahrens sich dreist an die Eröffnung der Gelenke machen konnte. Immerhin ist das besagte Gebiet interessant genug, um die Veröffentlichung einiger einschlägigen Fälle gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Bevor ich indess über diese Fälle, deren Kenntniss ich der Liberalität des Herrn Dr. Wagner zu Königshütte verdanke, berichte, will ich mir erlauben, Einiges über die Entstehung, Anatomie und Operation der Gelenkkörper voranzuschicken.

Die Entstehung der Gelenkkörper ist eine sehr mannigfache: weder unter hat Recht, wenn er alle Gelenkkörper als amorphe Konkretionen aus geronnenen, extravasierten oder exsudierten Massen ansieht, noch Leimar, wenn er sie alle durch ein Trauma entstehen lässt, noch endlich Rokitansky, wenn er dafür hält, dass sie alle Bildungen von Knorpeln oder Knochensubstanz in den kolbig angeschwollenen Synovialzotten seien; es können vielmehr verschiedene, vollständig differente Prozesse in ihrer Entwicklung führen.

Barwell ¹⁾ macht über die Entstehung der Gelenkmäuse folgende Angaben: Sie entstehen:

¹⁾ Brit. med. Journ. Febr. 1876.

1. durch Hypertrophie und Metamorphose von einer oder mehreren kolbigen Synovialzotten,
2. durch Transformation irgend einer Stelle in dem subsynovialen Gewebe,
3. durch Herauswachsen von Periost am Rande des Gelenkknorpel,
4. durch Organisation eines Blutgerinnsels,
5. durch direktes Wachsthum von Gelenkknorpel und
6. durch traumatische Abspaltung eines Stücks des normalen Gelenks.

Mit diesen Angaben ist aber die Aetiologie der Gelenkmäuse nicht erschöpft; so fehlen z. B. jene, welche ihre Entstehung einem in das Gelenk eingedrungenem Fremdkörper verdanken. Sodann lässt sich nicht verkennen, dass sich manche der hier aufgezählten aetiologischen Momente unter einen einheitlichen Gesichtspunkt bringen lassen. —

Hueter stellt in seinem Lehrbuch der Gelenk-Krankheiten ²⁾ eine aetiologisch - anatomische Gruppierung der Gelenkkörper auf und theilt sie in fibromatöse, lipomatöse und chondromatöse ein; aber auch gegen diese Eintheilung lässt sich manches einwenden; zudem will mir scheinen, als wenn in derselben der Aetiologie sehr wenig Rechnung getragen ist. —

Am klarsten und übersichtlichsten ist die Aetiologie der Gelenkkörper behandelt von H. Fischer ³⁾, so dass ich mich in der nachfolgenden Besprechung der Aetiologie der Gelenkkörper im Wesentlichen an jene Arbeit anlehnen werde.

Fischer unterscheidet nach dem Vorgange von Volkmann zwei grosse Gruppen der Gelenkkörper, erstens die in gesunden und zweitens die in kranken Gelenken entstandenen.

In gesunden Gelenken verdanken die Gelenkmäuse ihre Entstehung stets einem Trauma. Ueber diesen Punkt ist viel hin und her gestritten worden; während die einen Autoren diesen Entstehungsmodus nur für die wenigsten Fälle zugeben wollten oder sogar ganz leugneten, stellten ihn andere, besonders Brodhurst und Reimar, für die meisten, letzterer sogar für alle auf.

Freilich, wenn man den Begriff „Trauma“ sehr allgemein nehmen wollte, dann verdankt gewiss die grösste Zahl der Gelenkmäuse diesem ihre Entstehung, sicherlich die freien. Ich meine nämlich: nicht durch einen von aussen kommenden direkten Stoss oder Schlag entsteht oft im Gelenk ein freier Gelenkkörper, sondern bei der Bewegung des Gelenks durch die dasselbe bildenden Knochen, indem sie einen bis dahin gestielten Körper von seiner Implantationsstelle abheben; also, wenn man will, auch durch ein Trauma.

Will man aber von einem direkten Trauma reden, so entstehen im Gegentheil grade die geringste Zahl der Gelenkmäuse durch dasselbe, und die Ansicht Reimar's ist dann entschieden falsch. Es sind aber immer-

²⁾ Leipzig II. Aufl. 1876.

³⁾ Deutsche Zeitschr. für Chir. Bd. XII.

in unzweifelhafte Beobachtungen gemacht worden, dass Gelenkmäuse durch Absprennung eines Theils des überziehenden Gelenkknorpels entstehen können.

Schon Aebernethy und Monro sprachen sich in diesem Sinne aus, und in der neueren Litteratur finden sich mehrere derartige Beobachtungen, so von Stromeyer, Schuh, Velpeau, Meckel. Auch Virchow giebt in mehrfach Fälle beobachtet zu haben, in denen bei der Sektion ein Gelenkkörper und an einer Stelle des Gelenküberzuges ein Substanzverlust gefunden wurde, in den der Körper ganz genau hinein passte.

Reklinghausen⁴⁾ hat ebenfalls einen Fall beschrieben, in dem der Fremdkörper durch Abbrechen eines Theils des ganz gesunden Knorpels des inneren Oberschenkelknorpels entstanden war. Gaertner⁵⁾ operierte einen neunzehnjährigen Menschen wegen eines Gelenkkörpers im rechten Kniegelenk; der Gelenkkörper bestand aus Knorpelmasse und war seiner ganzen Länge nach durch ziemlich kurze Adhäsionen mit der Gelenkkapsel verwachsen. Bei der nachher wegen starker Eiterung nothwendig gewordenen Kniegelenksresektion stellte es sich heraus, dass der Gelenkkörper vom condylus internus abgesprengt war. Schoenborn⁶⁾ erwähnt eines von ihm operierten Falles, bei dem es sich zweifellos um eine Absprennung gesunden Gelenkknorpels handelte. Auch der von Klein⁷⁾ veröffentlichte Fall gehört hierher. Endlich sind ähnliche Beobachtungen von Deville, Richet, Broca, Volkmann, König und Fischer gemacht worden; vielleicht dürften auch die von Paulet⁸⁾, von Catrin⁹⁾ und Burkhardt¹⁰⁾, veröffentlichten Fälle hierher zu rechnen sein. —

Dass ein so elastischer Körper, wie der Gelenkknorpel erst durch eine grosse Gewalt abbrechen kann, erscheint natürlich. Schuh und Virchow halten eine vorausgegangene Erkrankung des Gelenks für das praedisponierende Moment. Es ist indess, glaube ich, nicht einmal nöthig, dass eine grob anatomisch oder histologisch nachweisbare Gelenkerkrankung vorliegt; nach einem Tripper z. B. kann sich „ohne Entzündung schleichend und schmerzlos ein starker Gelenkerguss nach Art eines Hydarthros entwickeln“ (Eichhorst). Wir würden aber, so lange der Hydarthros nicht besteht, klinisch das Gelenk für gesund halten.

Wie oft mag es ferner vorkommen, dass Leute in frühester Jugend, nach Scharlach z. B. eine Kniegelenksentzündung durchmachen, und doch, wenn sie zufällig später einen Gelenkkörper acquirieren, die Angabe machen,

⁴⁾ de corporibus alienis, Regiomonti 1864 —

⁵⁾ Würt. Corr. Bl. L XV. 28. 1875.

⁶⁾ Virchow-Hirsch Jahresber. 1881.

⁷⁾ Virchow Archiv XXIX p. 190.

⁸⁾ Lyon med. Nr. 3. 1881.

⁹⁾ Gaz. hebdomadaire de Méd. et de Chir. Nr. 38. 1881.

¹⁰⁾ Schweiz. Corr. Bl. XX. 7. 1880 Fall 1.

sie hätten nie eine Gelenkerkrankung gehabt. Mir wenigstens ist es aufgefallen, dass in einem der von Axel Iversen ¹¹⁾, publicierten, von Holmer operierten Fälle nach der Exstruktion der Gelenkmaus eine Epididymitis aufgetreten ist; ich wage freilich nicht mich über den Kausalnexus näher zu äussern, aber es wird doch der Verdacht rege, ob das betreffende Individuum nicht vorher einen Tripper durchgemacht hat. —

Im Fall II der von Burkhardt (lc.) veröffentlichten Beobachtungen wird die Frage nahe gelegt, ob der Zusammenhang zwischen Scharlach und Gelenkentzündung immer so bestimmt und klar dem Arzte angeben wird.

Zieht man ferner in Betracht, dass im Anschluss an ein Trauma eine begrenzte Entzündung der Gelenkkapsel mit Wucherung des Gelenkknorpels oder anderweite chronisch-entzündliche Prozesse sich entwickeln können, auf deren Basis schliesslich eine Gelenkmaus entstehen kann, so ist die Zahl der direkt durch das Trauma entstandenen Gelenkkörper verhältnissmässig klein. Wie oft mag es sich ereignen, dass am Knorpelrande flache Ekehondrosen sich bilden, die vielleicht nicht einmal die Bewegung des Gelenks erschweren, im Gegentheil den gegenüberliegenden Gelenkflächen sich anpassen und endlich bei irgend einer violenten Einwirkung innerhalb des Knorpels abbrechen. — In dem Sinne, dass Knorpelwucherungen nach einem Trauma entstehen können, möchte ich folgenden Fall von Strężek ¹²⁾ deuten: „Ein fünfundzwanzigjähriger Unteroffizier war auf einer steinernen Treppe auf das rechte Kniegelenk aufgefallen; etwa neun Monate später bemerkte er im Gelenke eine kleine Erhabenheit, die langsam wuchs und beweglich wurde; auch traten sehr bald Einklemmungserscheinungen auf. Str. fand den Körper am condylus internus fem.“

Wiewohl also von den Patienten mit Vorliebe ein Trauma als Entstehungsursache ihres Leidens angegeben wird, so ist es doch in den meisten Fällen nur die Gelegenheits-, nicht die direkte Ursache. Man muss sich selbst bei scheinbar noch so klar liegenden Beziehungen doch vor voreiligen Schlüssen sehr in Acht nehmen. — Der sicherste Beweis dafür, dass ein Fremdkörper ein abgesprengtes Stück Knochen oder Knorpel darstellt, ist jedenfalls der, dass nicht bloss die Uebereinstimmung mit dem normalen Gelenkknorpel in Form und Bau, sondern thatsächlich ein entsprechender Defekt in der Gelenkbekleidung sich nachweisen lässt. Man ist berechtigt alsdann zu verlangen, dass „an der Epiphyse das spongiöse Knochengewebe als solches deutlich zu erkennen sein muss, des Knorpels entblösst, höchstens mit amorphen Fibringerinnseln bedeckt.“ —

Der Mechanismus der traumatischen Entstehung der Gelenkmäuse ist ziemlich einfach. Legen wir der nachstehenden Betrachtung die Verhältnisse am Kniegelenk zu Grunde, an dem ja bekanntlich die meisten Gelenkkörper beobachtet sind, so ist es klar, dass die exponierten, kon-

¹¹⁾ Hospitaltitende II. 22. 1875.

¹²⁾ Wiener Med. Wochenschr. 1876. 51 bis 53.

verexen Gelenkflächen des Oberschenkels im Kniegelenk am häufigsten z. B. beim Fallen von scharfen Kanten getroffen werden, so dass ein Stück Gelenkknorpel allein oder mit einer kleinen Scheibe von Knochensubstanz abgelöst wird. Oder aber, wie z. B. beim Ellenbogengelenk, es fällt jemand auf die flache Hand und die ganze Körperlast ruht auf den Gelenkflächen der Unterarmknochen: dann können durch die Gewalteinwirkung Theile der letzteren abgesprengt werden. Hueter demonstrierte auf dem 5. Chirurgenkongress ¹³⁾ ein grosses zwei Drittel des Radiusköpfchens umfassendes Sprengstück, welches durch einen Fall entstanden war und mit besten Erfolg entfernt wurde. Volkmann ¹⁴⁾ und nach ihm Jüngken haben analoge Fälle beobachtet (Hueter).

Auch in den Fällen von Luxation des Vorderarms nach aussen mit Abbruch des epicondylus int. ¹⁵⁾ kam es öfters zu Bewegungsstörungen durch Interposition des abgesprengten Knochenstücks, und wenn diese zunächst nicht das Eigenartige der durch Gelenkmäuse hervorgerufenen Störungen zeigten, so steht doch nichts der Annahme entgegen, dass mit der Zeit der abgesprengte Condylus ein freier Gelenkkörper werden könnte. Es giebt also auch eine intrakapsuläre Fraktur Anlass zur Bildung einer Gelenkmaus.

Broca vertritt, wie Sander für alle Gelenkmäuse, so für derartig entstandene Gelenkmäuse sogar die Möglichkeit, dass sie im Gelenk noch weiter zertrümmert werden können, oder dass gleich durch das Trauma mehrere Knorpelstücke abgesprengt werden können. /

Nach allgemeinen pathologischen Anschauungen sollte man überhaupt meinen, dass alle Fragmente der Gelenkenden, wenn sie frei in die Gelenkhöhlen zu liegen kommen, wofern sie nicht zur Gelenkeiterung führen oder in anderer Weise das Leben bedrohen (intrakapsuläre Schenkelhalsfraktur!) sich den Gelenkmäusen ähnlich verhalten müssten; aller Ernährung beraubt müssten sie zum mindesten die Erscheinungen eines im Gelenke befindlichen Fremdkörpers zeigen.

Dieser allgemeinen Annahme widerspricht stellerweise die klinische Erfahrung. Brüche z. B. die genau am anatomischen Halse des Oberarms, also ganz intrakapsulär verlaufen, heilen in der weitaus grössten Zahl der Fälle an den Schaft an, auch dann, wenn das Bruchstück mit letzterem nicht durch Gomphose verbunden ist. Ja es sind sogar Brüche am collum anatomicum beobachtet, bei denen eine Umdrehung des abgebrochenen Kopfes stattfand, so dass derselbe mit seiner Gelenkfläche der Epiphysen-Bruchfläche, den Tuberkulis, mit der Bruchfläche aber der Epiphyse gegenüber stand, und selbst hier blieb der Kopf nicht als Fremdkörper liegen, sondern heilte an. Aber selbstverständlich kann auch eine Umbildung des frakturierten Kopfes zur Gelenkmaus eintreten (Koenig).

¹³⁾ 1876.

¹⁴⁾ Deutsche Klinik 1867 Nr. 48.

¹⁵⁾ cfr. Gräupner, Zeitschrift für Heilkunde Bd. VI, Prag 1885.

Hier dürfte ich vielleicht noch eines interessanten von Barwell beobachteten Falles Erwähnung thun. Bw. entfernte nämlich aus dem Ellenbogengelenk eines Matrosen elf Gelenkkörper, die alle vollständig voneinander getrennt waren; ausserdem bildete am innern Condylus die Synovialis eine Tasche, in der sich eine unzählbare Menge verschiedener Körperchen von allen Grössen befanden. Patient hatte vor Jahren eine durch einen Condylus gehende Fraktur erlitten. — Ich glaube nun, dass die Bildung der Gelenkkörper in einer ähnlichen Beziehung zur Gelenkfraktur gestanden haben wie die Arthritis deformans; die der Fraktur folgende Arthromyositis wird wohl den ersten Anstoss zu ihrer Entwicklung gegeben haben.

Mit der direkten Absprengung durch ein von aussen wirkendes Trauma oder durch eine Gelenkfraktur ist der Modus der Entstehung der osteochondralen Gelenkmäuse nicht erschöpft. Sie können auch einfach durch forcierte Bewegungen entstehen. Nehmen wir an, das Kniegelenk würde plötzlich weit über das physiologische Mass hinaus flektiert, was geschieht? Es wird die fibröse Kapsel und überhaupt der ganze Bandapparat (Ligamenta cruciata) aufs Aeusserste gespannt, und der Gelenkknorpel resp. die Menisken, da doch Fasern in sie hineinstrahlen, zunächst stark gezerrt, und wenn die Gewalt gross genug ist, schliesslich zum Theil abgerissen. Noch leichter wird dies geschehen, wenn die Bewegung des Gelenks eine complicirtere ist, z. B. nicht bloss eine reine Flexion, sondern mit irgend einer anderen, wie Innen- oder Aussenrotation, kombiniert ist, wobei zunächst inkongruente Gelenkflächen auf einander gelangen, und dann durch die Torsion die Gelenkbänder noch mehr gespannt werden. Dass solche Trauma und forcierte Gelenkbewegungen vergesellschaftet werden können, ist einleuchtend; dass aber auch durch letztere allein Stücke des Gelenkknorpels abreißen können, beweist ein Fall von Koenig¹⁶⁾. „Ein junger Mensch hatte zwei Jahre vor der Operation eine heftige Distorsion des linken Kniegelenks erfahren. Während nämlich sein Unterschenkel zwischen zwei Bänken eingeklemmt war, bekam er einen heftigen Stoss an die Seite des Oberschenkels, so dass das Knie erheblich in der Richtung von innen nach aussen umgebogen wurde. Unvermogen zu gehen und extremer Hämarthros folgte der Verletzung, welche den Verletzten wochenlang an das Lager fesselte.“

Von Zeit zu Zeit entwickelte sich nun nach heftigen Schmerzen bei einem falschen Tritt hydropische Anschwellung des Gelenks mit Schmerzen am inneren Gelenkspalt. Hier liess sich ein offenbar gestielter mässiger beweglicher Körper nachweisen.

Bei der operativen Entfernung des kleinen Körpers aus dem Gelenk zeigte es sich, dass derselbe mit einem derben bandartigen Strang dem condylus internus in der Gegend der Insertion des Ligaments anhaftete. Er war platt, etwa 4 mm dick, 3 cm lang, 1 cm breit, bestand aus Knochen und war aber mit einer auf beiden Seiten glatten, faserknorpeligen Schicht

¹⁶⁾ Berl. Klin. Wochenschr. Nr. 47. 1879.

überzogen. Der Körper liess kaum eine andere Deutung zu, als dass er einem Stück des Gelenkran des vom inneren Gelenkcondylus angehörte, welcher mit einem Theil des Bandes bei der Torsion des Gelenks abgerissen war.“

Am sichersten natürlich wäre der Beweis durch Leichenexperimente zu führen, die aber bis zur Stunde fehlen. Indess hat es, glaube ich, nichts Befremdendes eine solche Rissfraktur des Gelenkknorpels, wenn ich es so nennen darf, anzunehmen. Man denke doch nur an die von *Stromeyer* sogenannten Rissfrakturen der Malleolen, wo durch die Bänder selbst Knochenstücke abgerissen werden. —

Gelenkmäuse können ferner in einem gesunden Gelenk durch ein Trauma in der Weise entstehen, dass ein durch dieses hervorgerufener Bluterguss ins Gelenk resp. ein Blutgerinnsel den Grundstock für den späteren Gelenkkörper abgibt. Der erste, welcher diese Idee aussprach, war *John Hunter*, der alle Gelenkmäuse auf diese Basis zurückführen wollte. — Wenn man auch heute diese Anschauung im Allgemeinen fallen gelassen hat, so muss man doch für manche Fälle die Möglichkeit der Entstehungsweise zugeben. (*Velpéau*, *Meckel*). Indess hält man sich manche pathologische Erfahrung vor Augen, denkt man auch an einzelne Thierexperimente, so muss man diese Genese für eine sehr seltene, die entstandenen Gelenkmäuse selbst (mit *Fischer*) für vergängliche Gebilde halten. Die Inkrustation derselben dürfte sehr selten vorkommen, und wenn sie auch einige Zeit die charakteristischen Beschwerden machen, so pflegen sie doch meist nach Jahresfrist spontan und vollständig zu verschwinden. —

Die pathologische Erfahrung lehrt, dass sich grosse traumatische Blutergüsse ins Gelenk spontan resorbieren, und zwar nicht blos der flüssige, sondern auch der geronnene Antheil. Jedenfalls muss es schon als sehr seltenes Vorkommniss notiert werden, wenn ein Fibringerinnsel z. B. Monate lang im Gelenk liegen bleibt, um wie viel mehr, dass es durch Inkrustation etc. Anlass zur Bildung eines festen Gelenkkörpers geben sollte.

*Riedel*¹⁷⁾ hat über das Verhalten von Blut in Gelenken Experimente angestellt und (beim Kaninchen) gefunden, dass schon nach einer halben Stunde circa ein Drittel des Blutes geronnen ist, dass am fünfzehnten Tage von Endothel überzogene Kügelchen im Gelenke waren, die aus Fibrin, eingelagerten weissen mit Blutfarbstoff beladenen und den restierenden rothen Blutkörperchen sammt zahlreichen Fetttropfen bestanden, schliesslich dass am zwanzigsten resp. drei und zwanzigsten Tage keine Spur von Blut oder Blutgerinnsel im Gelenke sich vorfand, so prall sich dasselbe auch bei der Injektion gefüllt hatte.

Indem *Riedel* seine durch das Thierexperiment gewonnenen Resultate zu Gunsten zweier klinischen Beobachtungen verwerthet, kommt er zu dem Schlusse, dass auch beim Menschen eine ziemlich ausgedehnte

¹⁷⁾ Zeitschr. für Chir. Bd. XII.

Koagulation des Blutes im Gelenke wahrscheinlich, und dass diese Koagula relativ rasch resorbiert werden.

Weiterhin fand Riedel für diejenigen Blutkoagula, die sich an der Wand des Gelenkes anlegen, dass schon nach drei Tagen das Endothel des Gelenkes sich über dieselben hinüberschlägt, deutlich durch Silber nachweisbar; das Koagulum wird einfach in die Wand des Gelenkes aufgenommen, und nun schießen von dort aus Zellstränge in dasselbe hinein und durchwachsen es in ähnlicher Weise, wie jedes Gewebe, beispielsweise auch ein in der unterbundenen Arterie liegendes Koagulum durchwachsen wird unter der hinlänglich bekannten Metamorphose der Blutkörperchen. Somit würde das Thierexperiment sehr schön die Vermuthung Fischer bestätigen, dass das endliche Schicksal der Fibringerinnsel sei, dass sie mit bestimmten Stellen der Synovialis verwachsen wie der organisierte Thrombus mit der Gefäßwand und dadurch unschädlich werden. Ich bemerke, dass auch Aufrecht¹⁸⁾ das Festwachsen einer Gelenkmaus beobachtet hat.

Ueber die Bildung von Gelenkmäusen durch Eindringen fremder Körper in ein Gelenk sind von verschiedenen Autoren Beobachtungen gemacht worden. Namentlich waren Gewehrkugeln, welche jahrelang ohne Eiterung zu verursachen im Gelenk geblieben sind. Volkmann¹⁹⁾ führt Beobachtungen von Heister, Percy, Hennen, Guthrie und anderer Chirurgen an. Velpeau erzählt von einer Kugel, die, nachdem sie sich sieben und zwanzig Jahre lang in den Weichtheilen des Oberschenkels aufgehalten, plötzlich in die Höhle des Kniegelenkes hineingelangte, aus der sie mittelst des Schnittes entfernt werden musste. Oefters kommt es auch vor, dass eingedrungene Fremdkörper durch lokale Reizung eine begrenzte Entzündung des Gelenkknorpels erzeugen. Shaw entfernte aus dem Gelenk eines siebzehnjährigen Dienstmädchens einen freien Knorpelkörper, in dessen Innern sich eine Höhle von $\frac{1}{12}$ bis $\frac{1}{15}$ Zoll Länge vorfand, die eingekapselt eine abgebrochene Nadelspitze enthielt.

Mignot²⁰⁾ berichtet über folgenden Fall: „Ein sieben Jahr alte Mädchen empfand im Knie heftige Schmerzen, die einem vor kurzer Zeit gethanen Falle zugeschrieben wurden. Die Untersuchung ergab eine leichte Anschwellung ohne irgend welche Wunde oder Hautabschürfung am unteren Theile des Gelenks und Schmerzhaftigkeit bei Druck. In der Folge bildete sich ein kleiner Abscess, der sich an der tuberositas tibiae öffnete und eine Fistel zurückliess, die an eine caries aus skrophulöser Ursache glauben liess. Dieser Ansicht schlossen sich Nélaton und Velpeau, denen das Kind vorgestellt wurde, an. Durch den Gebrauch der Bäder zu Bourbon-L'Aρχambault schloss sich die Fistel

¹⁸⁾ Deutsch. Med. Wochenschr. Nr. 23. 1878.

¹⁹⁾ Pitha-Billroth's Sammelwerk 1882,

²⁰⁾ L'Union 154. 1873.

ach jedoch wieder auf, und nach drei Jahren zeigte sich eines Tages f dem Umschlage ein nekrotisches Knochenstück von der Grösse eines blen Nagels, in welchem das Ende einer dicken Nadel von $\frac{1}{2}$ " Länge eckte.

Binnen acht Tagen erfolgte Heilung.

Indem ich nunmehr zu der zweiten Gruppe der Gelenkkörper überhe, denen nämlich, die im kranken Gelenke entstehen, will ich von rnherein bemerken, dass auf der Basis irritativer Prozesse weitaus die össte Zahl derselben entsteht.

Betrachten wir zunächst ihre Beziehungen zur Synovialis. —

Die Synovialis ist eine bindegewebige Membran, welche alle Theile s Gelenkraums, mit Ausnahme des Knorpels bekleidet.

Man unterscheidet an ihr, ähnlich wie an den serösen Häuten ein sseres (parietales) und ein inneres (viscerales) Blatt.

Das paritale Blatt besteht aus fibrillärem Bindegewebe und bietet nig anatomisches Interesse, umsomehr das innere Blatt.

Dieses ist mit einer Lage von Endothel ausgekleidet und zeigt auf ner ganzen Oberfläche verbreitete Fortsätze, die man aber nicht als tten im gewöhnlichen Sinne auffassen kann.

Die Gelenkzotten sind überhaupt keine physiologischen Bilngen, wie Volkmann meint, wenn er von Wucherungen der physioischen Gelenkzotten spricht²¹⁾, sondern mehr weniger patholoche Bildungen. Auch Gurlt ist wohl dieser Ansicht, wenn er obachtungen von Gelenkzotten immer besonders und zwar noch unter n Capitel „chronische Entzündungen“ anführt. Als normale Bildungen den sie sich nach Koelliker²²⁾ da, wo sich die Synovialis von der sseren Fläche des Gelenks auf den Knorpel umschlägt.

Die Gelenkzotten stellen im Allgemeinen cylindrische, am freien Ende big anschwellende Gebilde dar, welche zu sekundären Ausbuchtungen, blen, Schläuchen, und diese wiederum zu solchen einer tertiären Foration auswachsen. Der bindegewebige, häufig gefässlose, zuweilen mit fässschlingen versehene Körper entbehrt nicht eines sehr regelmässigen berzuges von epithelioiden Zellen (Hueter). Je mehr freilich die Auschse sich vergrössern, desto leichter wird ihre Oberfläche der reibenden wegung seitens des Knorpels oder der gegenüberliegenden Synovialwand gesetzt, und dann muss der zarte Ueberzug des epithelioiden Gewebes loren gehen.

Bei der Dicken- und Höhenzunahme der zottigen Gebilde, wie sie n im Verlaufe langdauernder Reize zu Stande kommt, wird das Gewebe ner starrfaseriger und auch wohl gefässärmer. Es lässt sich endlich dem Durchschnitt weder makroskopisch noch mikroskopisch von dem ren, zellenarmen Fasergewebe der Fibrome unterscheiden, und da gleich-

²¹⁾ loc. cit. Seite 373.

²²⁾ Mikr. Anat. 1850. VI.

zeitig mit dem vermehrten Höhen- und Dicken-Wachsthum häufig Stiel dünn bleibt oder auch durch das Gewicht und die Bewegung der Zotten noch zu einem dünnern Strang ausgezogen wird, so kommt endlich papilläre Fibrom der Synovialhaut, wie Virchow diesen Zustand nennt hat, zu Stande. (Hueter.)

Unter dem Einfluss einer chronischen Gelenkentzündung wuchern nächst jene physiologischen Gelenkzotten an der Umschlagstelle der Synovialis, so dass sie den Knorpelrand mit einem zierlichen, oft mehr Linien langen Fransenbehang umgeben; es wachsen ferner die Fortsätze der Synovialis zu den von Rokitsansky sogenannten dendritischen Wucherungen aus, so dass schliesslich in einem Gelenke hundert und mehr solcher Vegetationen sich vorfinden. — Aber für die Lehre von den Gelenkzotten, ist nicht die Form der Vegetationen von Interesse, wo ein starker faseriges Bindegewebe das dominierende Gewebe ist, sondern jene Form, wo es innerhalb der Exkrescenz zur Entwicklung von Knochen und Knorpel kommt. Diese Erscheinung wird erklärlich durch die Thatsache, dass sich in den kolbig verdickten Enden der Zotten öfters Nester von Knorpelzellen vorfinden. Es liegt nun nahe anzunehmen, dass der gleiche Prozess der zur Entwicklung der Synovialauswüchse führt, eine Vermehrung Knorpelzellen wachruft. Oft findet man einen reinen hyalinen Knorpel sehr oft aber fasert sich die Grundsubstanz auf und noch öfter imprägnirt sie sich mit Kalksalzen und bildet jene steinharten Gelenkkörper, die wohl auch Arthrolithen genannt hat; auch trifft man direkt markhaltiges Knochengewebe in den Neubildungen an. Natürlich wird man in den meisten Fällen nicht eine Gewebsform, sondern die verschiedenen Entwicklungsstufen neben einander vorfinden.

Es liegt auf der Hand, dass die geschilderten Gebilde bei ihrem Wachsthum zunächst wieder durch die mannigfachen Insulte ihren thelioiden Ueberzug verlieren, dass ein Theil von ihnen zwischen die Gelenkflächen hineingelangen und bei irgend einer Gelenkbewegung vom Mutterboden abgetrennt werden kann, dass ein anderer Theil schliesslich bei seiner Lage zwischen Synovialis und Knochen ungeknickt, in die Synovialis hineingedrückt wird und hier Ausbuchtungen, Taschen, Divertikel erzeugt.

Die Gelenkzotten können aber noch eine andere Veränderung eingehen. Ihre Grundlage wird nämlich nicht immer von einem faserigen Bindegewebe, sondern bisweilen von einem stark fetthaltigen Bindegewebe gebildet, und es entsteht diejenige Form der Gelenkzotten, die Tillmann's als Fettzotten bezeichnet hat. Auch diese Gebilde kann man sehr zahlreich in manchen Gelenken finden. Volkmann²³⁾ bildet einen solchen in dem Kniegelenk ab, und auch Gurlt²⁴⁾ bringt einzelne Beobachtungen dieser Art.

Man hat die Fett enthaltenden Gelenkzotten allgemein mit dem Namen

²³⁾ l. c. S. 576.

²⁴⁾ Beitr. zur vergl. path. Anat. der Gelenke Berlin 1853. S. 257 u. f.

lipoma arborescens Muelleri belegt. Doch wenn ich *Virchow's* Definition recht verstehe, so ist das *lipoma arborescens* M. doch etwas anderes. V. leitet die Entstehung des *lip. arb.* von den Haversischen Drüsen ab, welche nichts weiter sind als ursprünglich subsynovial gelegene Fettzellen, die polypenartig in's Gelenk hineingewuchert sind. „Statt eines einzigen minutiösen Fettanhanges, schreibt *Virchow*, entstehen ganz kleine Kolben, die möglicherweise wieder an ihrer Oberfläche neue kleine Tuberculanzen bekommen, wieder Polypen erzeugen. So entsteht das, was man nach *Joh. Mueller* gewöhnlich mit dem Namen *lip. arborescens* bezeichnet, wo also eine fortschreitende Multiplikation an dem schon bestehenden Tumor auftritt.“

Abweichend hiervon schreibt *Gurlt* über das *lip. arborescens*: „Oft sind einige der fetthaltigen Zotten zu ansehnlichen, gestielten, seicht gekehlten oder ästigen Fettmassen herangewachsen, welche von einer zarten, glatten Membran bekleidet sind und das von *Joh. Mueller* sogenannte, auf Synovialhäuten vorkommende *lip. arborescens* darstellen.“ — Trotz dieser Differenz zwischen *Gurlt's* und *Virchow's* Anschauung ist doch viel klar, dass fetthaltige Zotten noch nicht ein *lip. arborescens* zu bilden vermögen. — Uebrigens führt auch *Gurlt* seine oben citierten Beobachtungen nicht unter den Namen *lip. arborescens* ein, sondern unter dem offenbar weit zweifigeren, aber nicht umsonst gewählten Namen: Fett enthaltende Gelenkzotten. — Dem *lip. arborescens* liegt noch eine Hyperplasie des Fettgewebes zu Grunde, und zwar des subsynovial gelegenen Fettgewebes nach *Virchow*, des in der Zotte befindlichen nach *Gurlt*.

Nachdem wir die Betheiligung des inneren Blatts der Synovialis an der Bildung der Gelenkkörper gewürdigt haben, müssen wir erwähnen, dass diese auch aus circumscripten Knorpel- und Knochenwucherungen des äusseren Blattes hervorgehen können. *Lacnec* trat zunächst dieser Behauptung auf; er führte aus, dass sie bei ihrem weiteren Wachsthum die Synovialis hervorstülpen, sich stielten und frei werden, so dass sie sich wie die aus den Zotten hervorgegangenen oben geschilderten Gelenkmäuse verhalten können. Die *Lacnec'sche* Lehre ist wohl heute allgemein anerkannt, zumal man oft Gelegenheit hat, diese Art Gelenkkörper in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien anzutreffen. *Gurlt*²⁵⁾ führt eine Beobachtung (von *Bonnet*) an, die für diese Lehre sehr bekräftigend ist. Er fand in einem Schultergelenk eine Anzahl von Gelenkkörpern, von denen einige die Grösse einer Haselnuss hatten. Die meisten fanden sich zwischen der Synovialhaut und der fibrösen Kapsel; andere waren in die Höhe und bildeten einen Vorsprung nach oben. Einige waren flottiert frei in dem Gelenke.

Den eben erwähnten Bildungen homolog sind jene, welche sich an der Umschlagsstelle der Synovialis auf den Knochen, aus dem Periost

²⁵⁾ l. c. Seite 261 Beob. 14.

entwickeln; ist ja doch die fibröse Kapsel nichts weiter als eine brüchförmige Fortsetzung des Periost's der im Gelenke zusammenstossen Knochen (Volkmann). Die Körper sitzen für gewöhnlich breit sind nicht spitz, nicht stalaktitenförmig, wie die Osteophyten, sondern abgerundet, konvex, und können entweder von der Tiefe aus verknöchern oder ganz knorplig bleiben.

Ihre Entstehung aus dem Periost ist leicht verständlich, da, wie der Lehre vom Kallus bekannt, die Beinhaut ein sehr produktives Gewebe ist. Wenn man dem noch die Bemerkung hinzufügt, dass unter Umständen auch der Kallus knorplig bleiben kann, so wird auch die Entstehung von durch und durch knorpligen Wucherungen aus dem Periost verständlich. —

Im Laufe unserer Auseinandersetzungen haben wir des Oeffteren darauf hingewiesen, dass sich eine Anzahl pathologischer Veränderungen gerade am freien Knorpelrande resp. hier zuerst entwickelt. Woher erklärt sich dies?

Bei jeder akuten oder subakuten Entzündung sieht man hier ein sehr zierlichen Gefässkranz sich ausbilden, indem, wie beim pannus conjunctivae zur cornea, so hier ein Gefässchen dicht beim andern im gestreckten Verlauf dem limbus cartilagineus zuströmt. Diese Erscheinung hat ihr physiologisches Analogon in der fötalen Entwicklung von Synovialfortsätzen über die Randzone der Gelenkflächen, in der schon von Toynbee beobachteten arkadenförmigen Gefässverzweigung. Wenn man die eben erwähnte Region bei jeder, auch chronischen Entzündung stärker vaskularisiert, der Synovialintima und dem darunter liegenden Knorpel also mehr Ernährungssäfte zugeführt werden, so ist wohl einzusehen, warum hier grade sich so gern hyperplasierende Prozesse etablieren, zumal der freie Knorpelrand noch der Ort des geringsten Widerstandes ist.

Nachdem wir nunmehr die verschiedenen Arten von Gelenkkörpern kennen gelernt haben, die auf der Basis einer chronischen Gelenkentzündung entstehen, dürfen wir wohl erwarten, gelegentlich einmal in denselben Gelenk mannigfache Formen neben einander anzutreffen. — Ja, wir kennen eine anatomisch wohl charakterisierte Krankheit, bei der dies öfters vorkommt; es ist dies die arthrititis deformans. Unter dieser stehen wir eine panarthrititis d. h. eine Gelenkentzündung, welche alle Gelenk konstituierenden Theile, als Knorpel, Knochen und Synovialis befällt.

Wir finden bei ihr neben verlängerten, fettig oder knorplig veränderten Gelenkzotten²⁶⁾, Knorpel- und Knochenauswüchse im parietalen Blatt der Synovialis, neben reinen Eckchondrosen auch Exostosen²⁷⁾, kurz alle die bereits beschriebenen Veränderungen. Es ist also äusserst leicht begreiflich, wenn man Gelenkmäuse auch in einem an arth. def. erkrankten Gelenke vorfindet.

²⁶⁾ Gurlt S. 257, 4. und Volkmann l. c. S. 561.

²⁷⁾ Virchow Geschwulstlehre Bd. I S. 456, Gurlt S. 443 Nr. 23 S. 566, 567.

Volkmann giebt an, dass sie bei arth. def. sehr häufig durch direkte knorpelige Umwandlung der Synovialis entstehen.

„An der freien Fläche des schwierig gewordenen, epithellosen, und oft mehr in verschiedene Lagen trennbaren Kapselbandes entstehen kleine, sehr wenig über das Niveau der Umgebung erhobene, flache Platten aus Knorpelgewebe, in deren tiefster Schicht rasch Verknöcherung Platz findet, während die freie Oberfläche knorpelig bleibt und fortwährend neues Material zur Ossifikation liefert.“

Die Zahl der bei arth. def. beobachteten Gelenkmäuse kann bisweilen ungewöhnliche Höhe erreichen: Volkmann z. B. giebt an, dass er bis 200 in einem und demselben Gelenk beobachtet worden sind. Er wie für die Bildung der Gelenkkörper bei arth. def. im Allgemeinen, kann man für die multiplen Bildungen im Besonderen den Satz aufstellen, dass die Symptome der Gelenkkörper vollständig verdeckt werden durch den ihrer Entstehung zu Grunde liegenden Krankheitsprocess. Immer sind solche Personen meist vollständig kontrakt, und erst am Knie wird die Existenz multipler Gelenkkörper constatirt.

In diesem Sinne hätte Cruveilhier Recht, wenn er behauptet, dass die Chirurgen meistens nur einen oder ein Paar Gelenkkörper finden, während die Anatomen viel häufiger mehrere oder sehr viele antreffen. Ihrer Allgemeinheit aber haben heutzutage Dank den Fortschritten der Chirurgie Cr.'s Worte keine Gültigkeit; denn heut scheut sich kein Chirurg auch zahlreiche Gelenkkörper aus dem Gelenk zu entfernen, die schon zu Cr.'s Zeit ein „noli me tangere“ waren. — Am allerseltensten entstehen Gelenkmäuse bei dem von Volkmann genannten hydrops fibrinosus. Bis zum Jahre 1876 waren nach Ranke²⁸⁾ sieben Fälle und zwar von: Velpeau, Meekel (2), Ridder und Volkmann beobachtet worden. Hierzu kommen drei resp. vier Beobachtungen aus der Koenig'schen Klinik²⁹⁾.

Der hydr. fibr. ist eine Gelenkwassersucht, bei der sich innerhalb der Gelenkhöhle zahlreiche kleine Körperchen, corpora oryzoidea, Reiskörperchen finden, frei vorfinden. Ueber die Entstehung der letzteren ist man noch unklar. Einfache, ich möchte sagen, unschuldige Gerinnungen sind zweifellos nicht, dagegen spricht die klinische Erfahrung; denn nach Riedel's Zusammenstellung giebt die Operation des hydr. fibr. eine sehr schlechte Prognose unter den Gelenkkörpern gewiss die übelste Prognose. Es muss also um einen weit ernsteren, tiefer liegenden Process handeln.

Riedel scheint der Ansicht hinzuneigen, dass es sich um tuberkulöse Entzündung der Synovialis und membranöse Ausschwitzungen auf die Gelenkhäute (nach Art des Kroup auf Schleimhäuten) handelt. Ob diese Ansicht richtig ist, müssen spätere Untersuchungen lehren. Jedenfalls ist bezüglich der Entscheidung dieser letzteren Frage jetzt in einer un-

²⁸⁾ Arch. für klin. Chir. Band XX.

²⁹⁾ Riedel Zeitschr. f. Chir. Bd. X u. Fischer l. c.

gleich günstigeren Lage, wo man die Charakteristika der Tuberkul exakt nachweisen kann. —

Auf eine höchst interessante Form der Gelenkkörper wurde in letzter Zeit durch Koenig die Aufmerksamkeit der Chirurgen gelenkt, auf Gelenkgeschwülste.

Schon bei Besprechung der lipomatösen Veränderung der Zotten hatten wir Gelegenheit gehabt uns mit einer Geschwulstform zu beschäftigen dem lipoma arboreseens Muelleri. Das lip. arb. M., das, wie wir oben gesehen haben im Sinne Gurlt's eine durch excessive Wucherung Fettgewebes innerhalb der Zotte entstandene Geschwulst darstellt, die Eigenthümlichkeit sich multipel auf Synovialhäuten zu entwickeln. Volkmann indess hat ein isoliertes Lipom des Kniegelenks beschrieben das wahrscheinlich aus einer Gelenkzotte hervorging; es hatte sich einem 63jährigen Manne im Laufe von 1½ Jahren entwickelt und sass an der lateralen Seite des Gelenks in der Höhe des oberen Drittels der Patella.

Was man aber gewöhnlich „Gelenklipom“ nennt, nähert sich mehr dem, was Virchow als lip. arb. bezeichnet. Wie nämlich Virchow von den Haversischen Drüsen ausführt, dass die ursprünglich subsynovial gelegenen Fettmassen sich unter Umständen in das Gelenk hineinstülpen können, so meint Koenig für alle Gelenklipome, dass sie ursprünglich nichts weiter als subsynovial gelegene Fettmassen seien, die sich in das Gelenk in ähnlicher Weise hineingebuchtet hätten, wie die Lipome zwischen den serösen Häuten; Koenig bezeichnet sie daher direkt als subseröse Gelenklipome und giebt an, dass sie am Kniegelenk, an dem bis jetzt diese Fälle beobachtet sind, von den zwei grossen Fettlagern desselben, dem einen zu beiden Seiten des lig. pat., dem andern auf der Vorderfläche des Oberschenkels gelegenen ausgehen.

Koenig³²⁾ veröffentlichte drei Beobachtungen von Fettgeschwülsen im Kniegelenk; in einem Falle von Barwell handelte es sich ebenfalls um lipomatöse Körper.*)

Ferner veröffentlichten Koenig und Riedel (ibid.) drei Fälle von eirkumskripten Tumoren, welche sich bei näherer Untersuchung als kugelförmige glomerierte Tuberkelknoten entpuppten.

Die betreffenden Geschwülste waren von einer derben Bindegewebshülle umkleidet und gingen von der Synovialfibrosa aus. Die Synovialintima ging über sie anscheinend (!) intakt hinweg; in einem Falle (Riedel)

³⁰⁾ Volkmann Jahresber. 1877.

³¹⁾ l. c. S. 206. 379.

³²⁾ Berliner klin. Wochenschr. Nr. 47. 1879 und Zeitschr. f. Chir. Bd.

*) Ich verweise hier auf die in allerneuester Zeit erschienene Dissertation von Dr. August Wagner: „Ueber Lipome des Kniegelenks“ Marburg 1887. Nach einem Ueberblick über die bereits veröffentlichten Beobachtungen beschreibt Dr. W. fünf einschlägige Fälle die im Knappschafftslazareth zu Koenigshütte von seinem Bruder operiert worden sind, eine sehr werthvolle Vermehrung der Kasus.

el) liessen sich an der dem Gelenk zugekehrten Seite der Geschwulst heinend (!) ganz normale Endothelien nachweisen. „In einem binde-ebigen Stroma, welches bald mehr den Charakter des Fibroms, bald r den des weichen Granuloms trug, waren massenhaft, wie die Folli- in einer Drüse, Tuberkel nachweisbar; die Hauptmasse bestand aus delzellen (jungem Bindegewebe) zum Theil in verfettetem Zustande, sich an eine Schicht derbfaserigen Gewebes anlehnten. Dazwischen stellenweise faseriges, aber starkkörnig degeneriertes, durch Essigsäure ellbares Gewebe, dem sämtliche zelligen Elemente fehlten, und das Eindruck machte, als sei hier ursprünglich fibrilläres Gewebe zu nde gegangen, und zwar einmal in Folge dauernder Compression und er wegen der geringen Blutzufuhr, da die wenigen in diesem Theile Geschwulst liegenden Gefässe zum Theil noch fettig degeneriert waren. Am Rande der Geschwulst fanden sich in Blut- und zellenreichem ebe zahlreiche Tuberkel mit wohl erhaltenen epithelioiden und een- Riesenzellen, in der Tiefe der Geschwulst deuten dagegen nur rund- e Haufen amorpher Masse an, dass hier wohl meist Tuberkel existier-

Uebergänge von frischen zellreichen zu diesen zerfallenen Gebilden men vielfach vor und legen der letzteren Genese klar“ (Riedel).

Es handelt sich also um eine besondere Form der Gelenktuberkulose, he in Form von knotigen Synovialgeschwülsten auftritt. Zuweilen en diese die Tendenz sich nach dem Gelenkinnern hin in Form von ppen — im groben Bilde sehr ähnlich etwas härteren Schleimpolypen Nase — zu entwickeln.

Weiterhin berichtet Koenig über eine gleichfalls sehr seltene Ge- ulstform, über ein Riesenzellsarkom des Kniegelenks, welches von subsynovialen Fett der lateralen Seite der Patella gewachsen war. on³³⁾ theilt einen Fall mit, wo eine sarkomatös entartete Gelenk- e die Erscheinungen eines Gelenkkörpers machte.

Im Allgemeinen aber muss man sagen, dass der durch Gelenkge- rülste erzeugte Symptomencomplex, wenn auch nicht im Wesen, so doch inigen Punkten von den durch Gelenkkörper sonst hervorgerufenen ptomen abweicht. Ihre Entwicklung ist eine allmähliche, manchmal ein Trauma vorher. Die Beschwerden, die sie verursachen sind ententheils gering, und auch die Funktionsstörung ist nicht bedeutend. inem Falle z. B. war sie nur insoweit beschränkt, als starke Flexion t möglich war; dagegen wurden starke Märsche ohne grosse Ermü- g ausgeführt. Ein Patient konnte sogar trotz seiner Gelenkerkrankung tanzen. Das bei anderen Gelenkkörpern so oft angegebene Symptom plötzlich eintretenden Funktionsunfähigkeit des Gelenks wird nicht agt; selten haben die Patienten Kenntniss von dem Vorhandensein Gelenkkörpers, was sonst so häufig gefunden wird. Der hydrops ist nkonstantes Symptom.

Die Anatomie der Gelenkkörper betreffend will ich, von den Ge-

³³⁾ Lang. Arch. Bd. VI S. 573.

schwülsten natürlich absehend, Virchow's³⁴⁾ Schilderung derselben anführen: „die solitären Gelenkkörper haben gewöhnlich eine mehr regelmässige Gestalt, am häufigsten sind sie konkav-konvex, wie die Patella oder platt rundlich. Die multiplen dagegen sind oft sehr unregelmässig höckrig, warzig, knollig. Manchmal sind sie unter sich sehr ungleich an Grösse und Gestalt, anderemal dagegen erscheinen sie einander angepasst, mit entsprechenden Gelenkflächen, wie die kleinen Knochen der Handwurzel oder des Mittelfusses. Dabei bemerkt man an vielen faden- oder stielförmige Anhänge oder feine Zotten oder eine faserige Umhüllung; manche jedoch sind ringsum ganz glatt.

Die Therapie der Gelenkkörper war von jeher eine operative. In der Gelenkhöhle wurde eröffnet und der Körper herausgeholt. Lisfranc und Fock riethen den Kranken durch vorhergegangene mehrtägige Ruhe für die Operation vorzubereiten, was besonders bei Schwellungen des Gelenkes auch heute noch zu empfehlen ist. Um das Entschlüpfen des Körpers zu verhindern, suchte man ihn vorher mit einer Nadel oder mit einem Häkchen (Pitha) zu fixieren. Die Haut kann etwas seitwärts verschoben werden (partellarwärts Koenig), damit nachher Kapsel und Hautwunde nicht zusammenfallen. Von einzelnen Chirurgen wurde von der Narkose abgerathen (Fock, Iversen), weil im entscheidenden Moment der Gelenkkörper durch eine unwillkürliche Bewegung (Breehbewegung, asphyktischer Anfall) entschlüpfen kann. Die Richtigkeit dieses Einwandes zu begeben, braucht man trotzdem doch nicht von einer Narkose abzustehen, weil zunächst ohne Narkose wohl noch eher unwillkürliche Bewegung eintreten werden, und weil man event. auch den Gelenkkörper fixieren oder ärgsten Falls, wenn wirklich einmal durch einen unglücklichen Zufall der Gelenkkörper entschlüpfen sollte, man die Narkose unterbrechen und den Patienten den Gelenkkörper suchen lassen kann, wie Dr. Fischer in einem Falle gethan hat. — Durch verschiedene Manipulationen kann dann der Patient den Gelenkkörper zum Vorschein bringen.

Jene Chirurgen, die von der Narkose abriethen, haben auch immer nur die Entfernung eines Gelenkkörpers im Auge, wie oft aber soll ihrer mehrere entfernt werden; hier ist doch der Werth der Narkose unbestreitbar.

Ob man der Gelenkkörperentfernung eine Ausspülung der Gelenkhöhle folgen lassen oder nicht, wird wesentlich von dem Zustande des letzteren abhängig sein. Ist sie pathologisch verändert oder während der Operation stark insultiert worden, so wird sich eine antiseptische Ausspülung des Gelenkinnern (Gutsch-Schede) empfehlen z. B. bei Reiskörpern, multiplen, schwer zu entfernenden Gelenkkörpern; in Fällen aber, wo z. B. bei den traumatischen Gelenkmäusen das Gelenk selbst vollständig

³⁴⁾ l. c. S. 54.

kt ist und auch während der Operation wenig leidet, unterbleibt offendi die Ausspülung besser. Alsdann wird ein antiseptischer Verband gelegt, das Glied fixirt und so gut wie ausnahmslos erreicht man die Heilung ohne Störung der Funktion des Gelenks.

Legen wir uns nunmehr die Frage vor: giebt die operative Entfernung der Gelenkkörper denn immer eine gute Prognose, ist sie auch immer ein radikales Heilverfahren? Ich will hier von den Fällen absehen, noch in neuerer Zeit, unter der Hand moderner Chirurgen unter sehr unglücklichen Erscheinungen verlaufen sind ³⁵⁾, weil möglicherweise die Antisepsis doch nicht so rigoros als nothwendig gehandhabt worden ist. Ich verweise vielmehr in dieser Hinsicht auf die Berichte aus der Koeniglichen Klinik ³⁶⁾. Riedel stellt in seiner Arbeit auch die Erfahrungen anderer Chirurgen (Velpéau, Volkmann, Meckel) zusammen, und nimmt, soweit es sich um die circumscribten Gelenkgeschwülste und den hydrops fibrinosus handelt, zu dem Resultate, dass die Prognose des Leidens mehr ungünstig zu stellen sei, ungefährlich es zur Zeit sein mag die Fremdkörper zu entfernen. In einem einzelnen Falle bestand gleichzeitig mit der Bildung fibrinöser Gelenkkörper chronische zum Theil tuberkulöse Entzündung der Synovialis. Trotzdem die reaktionslose Heilung der Operationswunde unter dem antiseptischen Verbands gelungen war, so waren doch die Folgezustände wenig ermutigend. Bald trat allgemeine Tuberkulose des Gelenks ein, und Recidive, in einem Falle sogar der Tod. Auch in dem von Fischer berichteten Falle von hydrops fibrinosus trat Eiterung ein; dieselbe verlief mässig und fieberlos, dauerte aber fünf Wochen und führte zu einer vollständigen Ankylosis des Handgelenks. *)

Ist die Entfernung auch immer ein radikales Heilverfahren?

Catrin ³⁷⁾ macht darauf aufmerksam, dass im allgemeinen bei Gelenkkörpern, die durch Trauma entstanden sind, die Operation mit der Beseitigung der Ursache der Krankheit diese selbst entfernt, was bei denen nicht der Fall ist, welche in Folge einer Affektion der Synovialis sich gebildet haben. Ist es doch auch vorgekommen, dass nach Exstirpation von Gelenkmäusen neue im Gelenk sich gebildet haben. Dies erscheint ja auch sehr wunderbar, wenn man sich überlegt, dass bei den durch Synovialkrankungen erzeugten Gelenkmäusen mit deren Entfernung nur ein symptomatisches Symptom, nicht aber die Krankheit selbst gehoben ist. Aber man kann deshalb den Werth der Operation nicht ableugnen, weil durch

³⁵⁾ Gaertner a. a. O. Richet, gaz. des hôp. 1880 Nr. 60, Heath, med. Times and Gaz. Juli 1879 und Fall IV bei August Wagner Inaug. Dissert. Marburg 1887.

³⁶⁾ Riedel Zeitschr. f. Chir. Bd. X.

*) vergl. einen ähnlichen Fall aus der v. Nussbaum'schen Klinik. Kremser Inaug. Diss. München 1885.

³⁷⁾ gaz. hebdomadaire XVIII Nr. 38 1881.

sie die Wirkung therapeutischer Agentien erleichtert und ein sehr wesentlicher Entzündungsreiz weggeschafft ist; auch ist nicht zu verkennen, dass die Patienten meist, selbst wenn Recidive auftreten, doch für längere Zeit von ihren Beschwerden befreit waren.

Wenn demnach die Prognose der Gelenkkörperentfernung nicht in allen Fällen eine gute ist, so liegt dies nicht in einem Mangel des Operationsverfahrens sondern in der Eigenthümlichkeit und Schwere der primären Gelenkerkrankung. Im allgemeinen kann man sagen, ist die Prognose absolut gut bei gesundem Gelenk, bei krankem Gelenk mehr vorsichtig zu stellen.

Um den Werth des heutigen Operationsverfahrens in seinem vollen Umfange zu erfassen, braucht man nur einen flüchtigen Blick auf die zahlreichen früheren Methoden und die durch sie erzielten Resultate zu werfen.

Wenn es wahr ist, dass die Zahl der Heilmethoden im umgekehrten Verhältniss zur Heilbarkeit einer Krankheit steht, so lässt schon die ziemlich grosse Zahl der früheren Operationsmethoden der Gelenkkörper den Verdacht rege werden, dass sie insgesamt den Anforderungen nicht genügen. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, kurz die früheren Methoden anzuführen.

Welcher schwerer Eingriff die direkte Excision (Paré) in der vasantiseptischen Periode war, kann man darnach bemessen, dass Bell erklärte lieber die Amputation des Oberschenkels im oberen Dritttheil zu machen zu wollen.

Bekannt mit den Gefahren der direkten Incision bediente sich noch im Jahre 1870 Prof. D e r o u b a i x ³⁸⁾ zu Brüssel, eines sehr umständlichen und wie ich glaube, obendrein noch ganz unzweckmässigen sogenannten pneumatischen (!) Apparats von Guérin. Nach Guérin nämlich wurde nach vollzogener Operation das verletzte Glied mit einem Kautschuck-Aermel bedeckt, der dasselbe fest einschloss und mit einem Apparate in Verbindung stand, der die Luft aus dem Aermel auspumpte. — Die Umständlichkeit und Unzweckmässigkeit dieses Apparates ist wohl ohne weiteren Kommentar einleuchtend.

Goyrand und Syme erfanden zu gleicher Zeit die Methode der subcutanen Entfernung der Gelenkkörper. Mit einem spitzen Skalpell schnitten sie unter Bildung einer Hautfalte auf den vorher in einem Gelenkrecessus fixierten Gelenkkörper ein und drängten ihn in das subcutane Gewebe, um ihn von hier entweder erst nach Vernarbung der Hautwunde oder sogleich (Velpéau) zu entfernen. Square in Plymouth und Liston bereiten im periartikulären Gewebe eine Art Höhlung vor, die der Gelenkkörper entschlüpfen kann — eine, wie Hueter mit Recht bemerkt, unnütze und vielleicht gefährliche Complicirung. Das Gleiche

³⁸⁾ Revue med. XXII. 29. 1870.

in noch höherem Masse von den Methoden nach Alquié und nach Bert.

Die Nachtheile der angeführten Methoden liegen auf der Hand. Es ist bei ihnen immer nur die Rede von der Entfernung eines Gelenkpers sein; der Gelenkkörper kann dem fixierenden Finger sehr leicht schlüpfen (L e j a m p t e l fixierte ihn durch den Ring eines Schlüssels); gelingt nicht immer ihn aus der Kapsel zu drücken, so namentlich, wenn er gestielt ist, und schliesslich weist die subcutane Methode, wenn die Operation im Uebrigen günstig verläuft, sehr viele Misserfolge auf. Mehr des historischen Interesses wegen führe ich noch an, dass man den Gelenkkörper unschädlich zu machen suchte, indem man sie fixierte z. B. durch Drahtnägel (D i e f f e n b a c h), durch subcutane Ligatur (N u s s u m). Heutzutage sind diese Methoden sammt und sonders verlassen. — Wollen wir uns einigermassen ein Urtheil über den Erfolg der in Frage stehenden Operationen einst und jetzt machen, so genügt hierzu eine kurze statistische Uebersicht.

Hippolyte Larrey (1860) stellte 170 Fälle zusammen, von denen 131 mit direkter Incision, 39 subcutan operiert wurden:

	direkte Incision 131	subc. Op. — 39
Erfolge	98 — 74,8 %	19 — 48,7 %
Todesfälle	28 — 21,3 %	5 — 12,8 %
ohne Resultat	5 — 3,8 %	15 — 38,4 %

Ganzen also 33 Todesfälle — 19,9 %

B e n n d o r f (1867) stellte 267 Fälle zusammen, hiervon

	direkte Incision 218	subc. Op. — 51
rascher Erfolg	143 — 65,6 %	29 — 56,8 %
schwere Komplikationen	32 — 14,6 %	5 — 9,8 %
Todesfälle	41 — 18 %	5 — 9,8 %
ohne Erfolg	2 — 0,9 %	12 — 23,5 %

Vergleicht man diese beiden Statistiken, so sieht man, dass die subcutane Operation bei sehr zahlreichen Misserfolgen die geringere Mortalität, die direkte Excision bei weniger Misserfolgen die grössere Mortalität und die Heilung unter schwereren Komplikationen aufzuweisen hat.

Die Statistik von Axel Iversen (1875) umfasst 34 Fälle aus dänischen Literatur, darunter 3 von ihm selbst, je 6 von Saxtorp und Holmer ausgeführte Operationen. Nur 2 Fälle — 5,88 % endet letal; aber sehr häufig schwere Komplikationen. Doch sind von diesen Fällen schon einige, wenn auch noch mangelhaft, antiseptisch behandelt worden.

Barwell (1876) stellt aus seinen Beobachtungen vom Jahre 18 bis 1875 88 Fälle zusammen, hiervon:

	direkte Inc. — 48	subcutane Op. — 40
mit Erfolg	44 — 91,6 %	29 — 72,5 %
Todesfälle	4 — 8,4 %	1 — 2,5 %
ohne Resultat	0 — 0 %	10 — 25 %

Im Ganzen 5 Todesfälle = 5,68 %. Am geringsten ist die Mortalität bei Jackson (Cincinnati-Lancet): 67 Fälle mit 4,4 % Todesfälle.— Diese kurze statistische Uebersicht lehrt unzweideutig das Sinken der Mortalität in neuerer Zeit, was wir berechtigt sind als eine Folge des antiseptischen Verfahrens anzusehen; ja wir dürfen hoffen, dass sich die Sterblichkeitsverhältnisse noch günstiger gestalten und sogar auf 0 % werden reducieren lassen wenigstens bei jenen Fällen, die nicht durch eine specifische Gelenkerkrankung compliciert sind.

Nachdem ich nunmehr einen Ueberblick über die pathologische anatomische und klinische Bedeutung der Gelenkkörper gegeben habe, erlaube ich mir jene Fälle aus der Praxis des Herrn Dr. Wagner, von denen ich den letzten selbst mitbeobachtet habe, anzuführen. Sie weisen manche Besonderheiten auf, die ich unten noch näher beleuchten werde.

I. Fall.

Reissung der mittleren Parthie der Quadricepssehne mit Abreissung eines Stückes der Patella.

Entfernung des letzteren durch den Schlitz in der Quadriceps-
sehne aus dem Gelenk (1 $\frac{1}{2}$ Jahr nach der Verletzung). Völlige
Wiederherstellung der Functionsfähigkeit des Gelenks.

Fräulein Sophie K., 26 Jahr alt, glitt vor anderthalb Jahren bei
Platz auf der Strasse aus, versuchte sich noch durch Anspannung ihrer
Hüftmuskulatur auf den Füßen zu halten, fiel jedoch trotzdem um, indem
sie plötzlich nach links umknickte; dabei verspürte sie einen äusserst hef-
tigen Schmerz im linken Kniegelenk und vermochte sich nur unter grösster
Anstrengung in ihre nahe gelegene Wohnung zu schleppen.

Es trat heftige Schwellung und Schmerzhaftigkeit ein, die von dem
behandelnden Arzte durch Eis und Gypsverband bekämpft wurde. Sechs
Wochen musste die Dame das Bett hüten, dann machte sie noch im Ver-
laufe die ersten Gehversuche. Das Gelenk war noch etwas angeschwollen
und spontan schmerzfrei; beim Gehen jedoch traten heftige Schmerzen
auf und war das Knie so schwach, dass Patientin noch $\frac{1}{4}$ Jahr nach der
Verletzung am Stocke gehen musste. Wenn sich nun auch das Gehver-
mögen in den darauf folgenden $\frac{3}{4}$ Jahren soweit besserte, dass Fräulein K.
kurze Strecken ohne Stock zurücklegen konnte, so war und blieb das Ge-
lenk doch schwach und schmerzhaft beim Gehen. Besonders war das
Aufsteigen sowohl auf- als abwärts absolut unmöglich ohne Stock
oder ohne dass sich die Dame mit beiden Händen fest an dem Geländer
halten konnte.

Fräulein K. consultierte verschiedene Aerzte, doch blieb trotz aller,
angewandten Mittel der Zustand ziemlich der gleiche. Am Besten half
noch eine von einem Specialchirurgen verordnete feste Lederkappe,
die sie beim Gehen trug und dasselbe weniger schmerzhaft und un-
behindert machte.

Als Dr. W. die Dame im Jahre 1882 sah, fand er Folgendes:

Das linke Knie ist um ca. 3 cm in seinem Umfange stärker als das
rechte, es befindet sich in demselben ein geringer Erguss. Die passiven
Bewegungen des Gelenks sind nahezu normal, bei activer forcierter

Streckung und Beugung klagt Fräul. K. über Schmerz. Bei allen diesen Bewegungen ist im Gelenk ausser dem erwähnten Erguss nichts Abnormes zu fühlen. Oberhalb der Kniescheibe findet man etwas nach aussen von der Mitte in der Sehne des Quadriceps einen etwa 1 cm breiten und 3 cm langen Spalt und in dessen Tiefe beim Eingehn mit dem kleinen Finger einen harten und etwas von oben nach unten und seitlich verlaufenden fühlbaren Körper.

Wenn auch eigentliche Einklemmungserscheinungen fehlten, war es doch auch dann nicht mit Sicherheit anzunehmen, dass alle Beschwerden auf diesen Fremdkörper zurückzuführen seien, so konnte eine Entfernung desselben doch nur zu einer Besserung der Functionsfähigkeit des Gelenks führen. Die Dame ging bereitwilligst auf die vorgeschlagene Operation ein.

Da der Gelenkkörper von den Seiten des Gelenks her absolut nicht zu fühlen war, so hielt Dr. W. es für am Gerathensten auf denselben durch den Schlitz der Quadricepssehne oberhalb der Patella einzugehen. Dr. W. liess die seitlichen Parthien der ersteren fest auf die vordere Gelenkfläche aufdrücken und schnitt auf den mit dem kleinen Finger fühlbaren Körper schichtweise ein, fasste denselben mit einem Haken und zog ihn hervor. Es zeigte sich, dass er an einem oben an der mittleren Parthie der Quadricepssehne angehefteten Strang hing, der die Länge von etwa 4 cm hatte.

Derselbe wurde an seiner Basis abgetragen und mit dem Köpfe entfernt. Er zeigte in seiner oberen Parthie noch deutliches Sehnen- und Bindegewebe, in der unteren bestand er aus einem weichen, leicht zerreisslichen, anscheinend verfetteten Gewebe. (Eine mikroskopische Untersuchung wurde nicht vorgenommen.) Der Gelenkkörper war dreieckig, stellte beinahe einen flachen Kreisausschnitt dar, dessen abgerundete obere, vordere und vordere Fläche weiss und glänzend aussah und sich rauhfühlig anfühlte; die Seitenflächen waren rauher und höckerig anzufühlen und von dunklerem Aussehen. — Wie sich jetzt auch deutlich an dem fehlenden Ausschnitt am oberen Rande der Patella nachweisen liess, bestand der Gelenkkörper aus dem oberen Rande der Patella, welcher offenbar von dem mittleren Theil der Quadricepssehne abgerissen war. — Seine Breite am oberen Rande betrug etwa 2 cm, die grösste Länge $1\frac{1}{2}$ cm.

Die Wunde wurde durch einige feine Nähte geschlossen, (ohne Drainage und Ausspülung) ein antiseptischer Verband darüber gelegt und das Bein in einer Volkman'schen T-Schiene fixiert.

Der Wundverlauf war ein völlig aseptischer. Nach 10 Tagen war die Wunde unter einem Verbande geheilt.

Dr. W. liess dann die Patientin umhergehen, etwas massieren, doch aus Vorsorge halber jedoch noch die erwähnte Kappe tragen. Schon vier Wochen nach der Operation konnte sie dieselbe ablegen, da das Gelenk schmerzlos, das Treppensteigen bei nur leichtem Halten am Geländer möglich war. Das Gelenk war völlig abgeschwollen. Allmählig besser

die Functionsfähigkeit des Gelenks derart, dass Fräulein K. dieselbe in einem Jahre für normal erklärte, Berge bestieg, tanzte, kurz ihren ganzen Kniegelenken alles das zumuthete, was man von einem normalen Gelenk verlangen kann.

Untersucht hat Dr. W. das Gelenk zum letzten Mal 4 Wochen nach der Operation, da die Dame abreiste und seit dieser Zeit in die dortige Gegend nicht mehr kam.

Epikrise.

Dieser Fall bietet des Interessanten sehr viel. Dass durch einen Sturz, durch Straucheln oder dergl. die Quadricepssehne reisst oder die Patella frakturiert wird, ist wohl öfters beobachtet: dass aber ein so kleiner Theil losgerissen wird, dürfte wohl nicht vorkommen sein, wenigstens weist die Literatur einen derartigen Fall nicht auf.

Es erscheint mir wahrscheinlich, dass der Sehnenstrang, an dem das Fragment hing, anfangs mit den Seitentheilen der Quadricepssehne in einem festeren Zusammenhang gestanden habe, und dass die Lösung desselben erst allmählig erfolgt sei. Mit dieser Anschauung wäre ja auch sehr einfach die vorgefundene fettige Degeneration des Sehnenbündels zu erklären. — Warum der Riss grade in dieser so eigenartigen Weise erfolgt ist, ist völlig unklar; experimentell würde er sicher nicht sich so erweisen lassen.

Klinisch merkwürdig ist, dass dieser kleine Körper so unangenehme Erscheinungen machte. Wenn auch der gleich nach dem Falle beobachtete Symptomenkomplex der Gelenkschwellung, des Schmerzes etc. als direkte Folge der Distorsion angesehen werden muss, so ist doch die spätere Funktionsstörung sicher durch jenes Körperchen hervorgerufen, und es ist kaum zu begreifen, wie dies möglich war. Um sogenannte Einklemmungserscheinungen handelte es sich kaum. Denn wo sollte sich dieses immerhin fixierte Körperchen eingeklemmt haben? Zwischen Ober- und Unterschenkelknochen sicher nicht. Zwischen Patella und Unterschenkel? auch nicht, denn, da bei der immerhin langen Dauer des Leidens die Einklemmung sehr oft hätte erfolgt sein müssen, wäre der schwache Stiel lange gerissen. Zudem ist ja noch die Frage, ob überhaupt, wie wir oben auseinandergesetzt haben, das Stückchen Patella wirklich total getrennt war, so dass, war dies nicht der Fall, eine Einklemmung erst recht nicht möglich war.

Es ist vielleicht möglich, dass die starken Schmerzen durch Reizung der in der Sehne gelagerten Nerven und Nervenendapparate hervorgerufen waren, was jedesmal geschah, wenn bei Bewegung der Extremität das Knochenstückchen zwischen die Seitentheile der Sehne gepresst wurde — daher

vielleicht die gute Wirkung der festen die Beugung verhindern Gummikappe.

Gewinnt ja doch auch im Allgemeinen die Ansicht immer mehr an Boden, dass bei Gelenkkörpern die sogenannten Einklemmungserscheinungen hervorgerufen werden nicht durch ihr Dazwischenlagern zwischen die Knochen, sondern durch Zerrung der Gelenkkapsel, also bindegewebigen Apparates.

Bei der Lage des in Frage stehenden Gelenkkörpers musste hinsichtlich der Operation von dem gebräuchlichen Modus der seitlichen Eröffnung des Gelenks abgewichen werden. Es war ja offenbar auch die Nächstliegende direkt auf den Körper einzuschneiden, um so auf dem schnellsten und kürzesten Wege ihn zu entfernen.

II. Fall.

Abgesprengung eines theils knorpeligen, theils knöchernen Stückes des Condylus externus femoris.

Unbegrenzte Anheilung, allmähliche Lösung des Stückes
durch starken Gebrauch des Gelenks, Entfernung des abge-
sprengten Knochenstückes 5 Monate nach der Verletzung.
Heilung.

Häuer Adam P. 37 Jahr, war im Sommer 1881 verschüttet worden.
Er hatte ausser einer Anzahl kleinerer Verletzungen eine Quetschung des
rechten Kniegelenks erlitten. Starker Bluterguss mit grosser Schmerz-
haftigkeit bei seiner Aufnahme.

Der Bluterguss ging zurück unter Massage, Einwickelungen etc., doch
dauerte es beinahe $\frac{1}{4}$ Jahr, bis P. wieder soweit war, dass er in die Ar-
beit gehen konnte. Bei seiner Entlassung war nichts Abnormes in dem
Gelenk zu constatieren.

Etwa 2 Monate nachher kam er wieder ins Lazareth und gab an, er
habe seit seiner Entlassung stets beim Arbeiten Schmerzen gespürt, und
dass ihm das Knie in den letzten Wochen immer mehr und mehr ange-
swollen. Es zeigt sich ein sehr bedeutender Erguss, und nachdem
derselbe etwas bei ruhiger Lage zurückgegangen, findet sich direct auf
dem Condylus externus femoris eine spitze Vorwölbung, die sich auf ihrer
Unterlage etwas verschieben lässt.

Nach mehrfacher Untersuchung kam Dr. W. zu der Ueberzeugung,
dass hier bei dem vor 5 Monaten erlittenen Trauma ein Stück des Con-
dylus externus abgesprengt worden, welches während der Zeit, in welcher
er im Lazareth lag auf seiner Unterlage „angebacken“, aber dann als P.
arbeitete, sich wieder losgelöst hatte. Durch einen Einschnitt auf den
Condylus externus wurde die Stelle freigelegt und constatirt, dass das
abgesprengte Stück allerdings mit seiner Unterlage verwachsen, aber doch
abheglicher war, als von vornherein angenommen worden war. Es war
unmissverständlich mit einem breiten festen Stiele von ca. 2 cm Länge auf
der Unterlage d. h. auf dem Condylus externus befestigt. Dieser Stiel
wurde mit einigen Scheerenschnitten durchtrennt und der Fremdkörper

entfernt. Letzterer zeigte eine etwas dreieckige Gestalt und auf seiner äusseren Fläche Knorpelüberzug, an der Basis war er rauh, deutlich knöchern.

Da das Gelenk breit eröffnet worden war, so wurde es mit 5 % Carbolsäurelösung ausgespült und ein kurzes Drain eingelegt.

Die Heilung erfolgte ohne irgend welche Zwischenfälle und konnte P. vier Wochen nach der Operation geheilt in die Arbeit entlassen werden.

Epikrise.

Wir haben bereits oben ausgeführt, dass es durch eine intrakapsuläre Fraktur zur Entwicklung einer Gelenkmaus kommen kann; dieser Fall gehört offenbar zu jener Gruppe —

Es handelt sich hier zunächst um den Beginn der Bildung einer Pseudarthrose, die vielleicht ganz straff und fest geworden wäre, wenn nicht Patient genöthigt gewesen schon nach 3 Monaten seine immer noch sehr schwere Arbeit wieder aufzunehmen; sie wäre vielleicht straff geworden, um die Functionen des Gelenks nicht weiter zu beeinträchtigen, wenn die Gelenkmaus wäre, wenn man so will, festgewachsen.

Indes die straffe bindegewebige Vereinigung wurde durch die Bewegung der Extremität gestört; die Adhäsionen waren zu schwach, um allen Insulten zu widerstehen. Die Bindegewebsstränge wurden daher theils gedehnt und gelockert, theils direkt zerrissen. — Nun wurde der operative Eingriff vorgenommen. Wäre dies nicht geschehen, wäre vielmehr nach Ablauf des Gelenkhydrops Patient wieder seiner Arbeit nachgegangen, wäre der weitere Fortgang wohl der gewesen, dass sich der Stiel noch weiter gedehnt hätte oder total zerrissen wäre, so dass der frakturierte Theil des Condylus ein „freier“ Gelenkkörper geworden wäre.

So weit war es hier aber noch nicht gekommen; der Stiel war vielmehr kurz, fest und breit und machte grössere Exkursionen des Bruchstückchens unmöglich. Hiermit im Zusammenhange steht auch eine wichtige Abweichung in den klinischen Merkmalen des vorliegenden Falls. Nicht, wie es bei Gelenkmäusen geradezu pathognostisch ist, plötzlich und blitzartig waren die Schmerzen, sondern konstant; schmerzfreie Pausen, in denen auch die Function des Gelenks nicht gestört war, gab es gar nicht.

Besonders lehrreich ist der vorliegende Fall noch in einer Beziehung, er beweist unzweideutig, dass durch äussere Gewalteinwirkung ein Stückchen des ganz gesunden Gelenkendes abgesprengt werden kann.

III. Fall.

Bohnengrosse Gelenkmaus aus Knorpel bestehend nach einem vor 2 Jahren erlittenen Trauma.

Extraction. — Heilung.

H. A. 13 Jahr alt, soll vor ca. 2 Jahren beim Turnen einmal auf linke Knie gefallen sein. Er habe sofort Schmerzen im Gelenk gehabt, doch sei er nicht bettlägerig gewesen und nur ca. 14 Tage hinkend gegangen. Dann sei der Schmerz geschwunden, doch habe der Knabe von da ab bei Anstrengungen öfters über eine gewisse Schwäche im linken Knie geklagt. Vor einem Jahre sei das Knie auch einmal angeschwollen, dass A. mehrere Tage im Bette liegen musste.

Die Anschwellung sei alsdann wieder geschwunden, doch sei das Knie von da ab stets schwächer geblieben. Erst vor $\frac{1}{4}$ Jahre trat beim Knien plötzlich ein heftiger Schmerz im Gelenk auf, der den Knaben verhinderte aufzustehen. Es kam ein Erguss in's Gelenk dazu, der sich von da ab nicht mehr vollständig verlor. Oefter traten besonders bei stärkerer Bewegung wieder heftige Schmerzen im Gelenk auf. Der behandelnde Arzt suchte einmal mit Bestimmtheit einen beweglichen Fremdkörper nach, ohne bei solchen Anfällen gefühlt zu haben.

Als Dr. W. den Knaben im Februar 1880 zum ersten Male sah, konnte er ausser einem mässigen Erguss im Gelenk nichts constatieren.

Erst bei einer erneuten Untersuchung ca. 14 Tage später gelang es Dr. W. einen etwa bohnengrossen Fremdkörper am Rande des Condylus femoralis zu finden. Derselbe war sehr leicht beweglich und verschwand plötzlich wieder im Gelenk. Acht Tage nachher gelang es erst wieder nach langem Suchen und mannigfachen Bewegungen denselben zu finden. Er wurde sofort fixiert und durch einen kleinen Schnitt extrahiert. Letzterer wurde durch 3 feine Nähte geschlossen. Nach 10 Tagen war die kleine Wunde geheilt, das Gelenk völlig frei beweglich. Ein halbes Jahr später war noch vollständiges Wohlbefinden vorhanden, dann hat Dr. W. nichts mehr von dem Knaben gehört.

Die Gelenkmaus hatte etwa die Grösse und Form einer grossen

Bohne, sah trübe und glänzend aus und bestand makroskopisch b. Durchschnitt nur aus Knorpel. Eine mikroskopische Untersuchung wurde verabsäumt.

Epikrise.

Bei flüchtiger Betrachtung würde man wohl geneigt sein in diesem Falle eine rein traumatische Entstehung der Gelenkmaus anzunehmen, es sei bei dem vor 2 Jahren erfolgten Sturze ein Stückchen Knorpel gerissen, habe aber aus irgend welchen Gründen, vielleicht infolge Beschaffenheit des Stieles oder dergl., bis $\frac{1}{4}$ Jahr vor der Operation charakteristischen Erscheinungen einer Gelenkmaus nicht gemacht.

Ich glaube aber, dass auch in diesem Falle, wie in vielen anderen, die Entstehung der Gelenkmaus nur in einem mittelbaren, nicht unmittelbaren Zusammenhang mit dem Trauma steht. Wäre jene wirklich dem Sturze entstanden, dann wäre der Symptomenkomplex doch ein anderer gewesen. Patient wäre wohl nicht mehr im Stande gewesen sich zu erheben, so sehr hätte ihn der Schmerz überwältigt. Es wäre auch verschieden nachher eine Gelenkwassersucht entstanden, die den Patienten eine Zeit lang ans Bett gefesselt hätte, um es kurz zu sagen, die Krankheitserscheinungen wären akute gewesen.

Im vorliegenden Falle aber hat sich das gesamte Krankheitsbild innerhalb eines ziemlich laugen Zeitraumes abgespielt; der Krankheitsprocess war offenbar chronisch und exacerbierte nur zeitweise. — Was wir oben gesehen haben, können auf der Basis chronisch-irritativer Prozesse im Gelenk am freien Knorpelrande Wucherungen entstehen, die, wenn sie eine bestimmte Grösse erreicht haben, durch die Bewegung der Extremität abgebrochen werden und freie Gelenkkörper werden. Vielleicht, dass dies auch für unsern Fall seine Geltung hat; wenigstens lässt sich mit dieser Annahme das Krankheitsbild sehr gut erklären.

Ich will allerdings nicht in Abrede stellen, dass man es auch auf andere Weise erklären könnte; aber ich glaube, dass man keinesfalls darüber wird hinwegkommen können, anzunehmen, dass nach dem Trauma sich im Gelenk ein chronischer Entzündungsprocess etablierte, und dass diesem die Hauptschuld an der Entstehung des Gelenkkörpers zugeschrieben sei.

Somit müssen wir diesen Fall in die Gruppe der in kranken Gelenken entstandenen Gelenkkörper verweisen.

IV. Fall.

Fremdkörper aus Knorpel und Knochengewebe, entstanden ohne nachweisbare Ursache in einem genu varum.

Excision. — Heilung.

Adolf W. 19 Jahr alt, Commis. Seitdem W. Kaufmann geworden, sich allmählig bei ihm ein rechtsseitiges genu varum gebildet, welches jedoch nicht hinderte seinem Berufe nachzugehen. Erst seit $\frac{1}{2}$ Jahr er ohne besondere Ursache Schmerzen im Gelenk gehabt haben; das- sei öfter angeschwollen; auch habe er manchmal beim Niederknien ge Stiche im Gelenk bekommen, so dass er nur mit Mühe aufstehen te. W. begab sich zu Herrn Dr. W., um sich von seinem genu varum ien zu lassen, dem er die Schuld an seinen sich immer steigenden werden zuschrieb. Dr. W. fand einen mässigen Erguss im Gelenk, en Ursache er sich nicht recht erklären konnte und untersuchte des- das Gelenk sehr genau. Erst bei der dritten Untersuchung fand W. an der Innenseite des Gelenks beinahe in der Gelenklinie einen glichen Fremdkörper, der sich bei starker Streckung weiter vorschob, verschiedenen Bewegungen des Gelenks überhaupt seine Lage sehr uderte, auch schwer fixiert werden konnte.

Die Exstirpation gelang trotzdem recht leicht in der Weise, dass W. sofort, nachdem er auf den Fremdkörper eingeschnitten hatte, elben mit einem feinen Häkchen fixieren liess.

Beim Herausziehen zeigte sich, dass der Körper einen von oben, en herkommenden dünnen bindegewebigen Stiel hatte.

Die Wunde wurde ohne Ausspülung des Gelenks mit einigen feinen en geschlossen, das Bein in einer Pappschiene fixiert.

Nach 14 Tagen bei Abnahme des Verbands war die Wunde geheilt elenk völlig abgeschwollen. Nach weiteren 8 Tagen ging W. wieder m Berufe nach.

Der Fremdkörper war ca. 2 cm lang und 1 cm breit, länglich, von s rautenförmiger Gestalt, auf seiner etwas convexen Aussenseite eglänzend knorpelig, auf der concaven Innenseite etwas rauher, von der, wenig glänzender Farbe und hatte hier unter einem sehr dünnen pelüberzuge deutliches Knochengewebe.

Zu einer Operation seines genu varum konnte sich W., da er nach Exstirpation seiner Gelenkmaus keine Beschwerden hatte, nicht mehr entschliessen, und Dr. W. bereute es dann, dass er nicht gleich eine Arthotomie auch die Osteotomie des Femur zugefügt hatte.

Epikrise.

Wie im vorliegenden Falle die Gelenkmaus entstanden sei, ist schwer zu sagen.

An sich ist es ein sehr seltenes, wenn überhaupt je beobachtetes Vorkommnis, dass sich in einem genu varum eine Gelenkmaus entwickelt und gerade darum glaube ich auch, existierte zwischen beiden kein Zusammenhang. Denn, wenn dies der Fall wäre, müssten wohl bei der ungemeinen Häufigkeit des genu varum, auch Gelenkkörper in ihm sehr öfter zur Beobachtung gekommen sein.

Der Körper fand sich am cond. int. mit ihm durch Bandfasern verbunden. Sollte er von demselben abgesprengt worden sein? die Anamnese giebt hierfür nicht den mindesten Anhalt.

Es befand sich im Gelenk eine ziemlich grosse Menge Flüssigkeit. Woher kam dieser hydarthros? das genu varum allein erklärt ihn nicht. Denn erfahrungsgemäss findet sich bei genu varum kein hydrops. Wahrscheinlich wird also erst der Gelenkkörper den Reiz für die Flüssigkeitsansammlung abgegeben haben. Man müsste alsdann annehmen, dass ersterer aus der Gelenkkapsel oder dem Knorpel hervorgewachsen sei.

Vielleicht ist aber doch der hydarthros früher und zwar aus anderen Ursachen entstanden und der Gelenkkörper resp. sein Grundstock nur ein ausgefälltes Gerinnungsproduct anzusehen. — Alles dies sind Fragen, auf die wir eine positive, unbestreitbare Antwort zu geben, nicht im Stande sind, so dass wir offen erklären müssen, der Fall sei sehr dunkel.

V. Fall.

Multiple Körper.

Alexander Danetzky, 34 Jahr alt, verheirathet, giebt an vor nunmehr Jahren im rechten Kniegelenk heftiges Reissen gehabt zu haben, wegen dessen er im Hospital zu B. Hülfe suchen musste. Er wurde dort Jahr lang mit Einreibungen und Bädern behandelt und als „gebessert“ lassen. Doch kaum hatte D. seine Arbeit als Wagenschieber in der Grube begonnen, da stellten sich wieder Schmerzen im Knie ein, nunmehr mit Röthung und Schwellung.

Es genügten indess einige Tage Ruhe; Schwellung und Schmerzen wanden, aber nur um sich nach Austreibungen alsbald wieder einzustellen.

Vor circa 4 Jahren bemerkte D. zum ersten Male oberhalb der Kniescheibe an ihrer Innen- und Aussenseite 2 Körperchen („Gruscheln“), welche er im Bogen um die Kniescheibe herum nach unten innen resp. aussen führen konnte, wo sie verschwanden. Doch sassen sie nach kurzer Zeit wieder an der ersterwähnten Stelle. Er habe beim Gehen öfters einen furchtbaren Schmerz im Knie empfunden, so dass er mit stark gebeugtem Knie habe stehen bleiben und sehr behutsam die Streckung der Extremität versuchen müssen; nachdem ihm dies gelungen, sei der Schmerz verschwunden. Oefters habe er im Kniegelenk ein Krachen gespürt. Er giebt an, eben solches Krachen bei Bewegung im rechten Hüft- und Schultergelenk zu verspüren, und in der That kann D. durch Bewegungen seiner Hand resp. seines Oberarmes dasselbe so laut erzeugen, dass es auf grössere Entfernungen hörbar und der Hand des Untersuchenden auch fühlbar ist.

Am 26. September wurde D. in das Knappschaftslazareth aufgenommen. Er klagt hauptsächlich über Schmerzen im rechten Kniegelenk, die sich bei jeder Anstrengung erheblich steigerten, hat jedoch bis zu seiner Aufnahme noch in der Grube gearbeitet. Das Gehvermögen des Patienten bei seiner Aufnahme noch ein verhältnissmässig leidliches; er hinkt nur etwas, doch nicht bedeutend. Das rechte Kniegelenk ist um ca. 1 cm in seinem Umfange stärker als das linke. Bei der Palpation fühlt sich das Knie von allen Seiten sehr hart an, und die genauere Untersuchung giebt, dass beinahe in dem ganzen palpablen Theil des Gelenks in der

Synovialis mehr oder weniger grosse, harte Massen eingebettet sind. Im Gelenke befindet sich offenbar, wie dies aus dem mässigen Tanzen der Patella hervorgeht, ein nicht bedeutender Erguss. Geht man mit den Fingerspitzen zwischen den erwähnten harten Massen in das Gelenk ein, so fühlt man dort beinahe überall kleine und grössere harte Körper, welche sich hin- und herschieben lassen, und welche zum Theil besonders hervortreten bei Beugung des Gelenks. Letztere ist bis zu einem stumpfen Winkel möglich, doch nicht schmerzlos. Bei allen Bewegungen des Gelenks fühlt und hört man deutlich starkes Reiben und Knarren.

Am 28. September wurde die Arthrotomie in der Narkose vorgenommen und zwar in der Weise, dass zu beiden Seiten der Partellarschnur 16 cm lange Schnitte gemacht wurden und von beiden Seiten mit den Fingern in das Gelenk eingegangen wurde.

Man fühlte jetzt deutlich eine grosse Zahl theils kleinerer, theils grösserer harter Körper, welche theils frei im Gelenke lagen, theils an Stielen mit der Synovialis zusammenhängen, theils auf letzterer mit breiter Basis aufsassen, theils aber auch noch plattenförmig im parietalen Blatt der Gelenkkapsel sass. Mehrere solcher Körper waren auch mit der Oberfläche der Condylen im Zusammenhang und zwar meist locker aufliegend. Nur auf der Vorderfläche des condylus externus sass eine verhältnissmässig grosse Exkrescenz fest auf dem Knochen pilzförmig auf und musste mit dem Meissel entfernt werden. Die Entfernung der freien und schon ins Gelenk hineingewachsenen Körpermassen machte natürlich keine besondern Schwierigkeiten, dagegen nahm die Exstirpation der im parietalen Blatt sitzenden platten Körper viel Zeit in Anspruch und mussten dabei ziemlich grosse Stücke der festgewachsenen Synovialis mitexstirpiert werden. Es geschah die Entfernung dieser Parteen meist der Weise, dass der betreffende Theil der inneren Gelenkfläche durch einen grossen seitlichen Schnitte nach aussen gestülpt wurde. Besonders schwierig war dies trotz Verlängerung der Schnitte im oberen Recessus, doch gelang es schliesslich sämtliche harte Massen zu entfernen. Das Gelenk wurde dann ausgespült (Sublimat 1:1000), drainiert und mit einem Hagedorn'schen Mooskissenverband in einer Volkman'schen Schiene fixiert.

Der weitere Verlauf war ein durchaus antiseptischer. Bei dem ersten Verbandwechsel (am 4. Tage) wurden die Drains entfernt und nach weiteren 10 Tagen die Nähte; ca. 3 Wochen nach der Operation waren sämtliche Wunden geheilt. Nach 4 Wochen Gehversuche, Massage, Bäder; Bewegung über den rechten Winkel möglich; keine Schmerzen, keine Recidive.

Status vom 18. November: Patient kann ohne jede Anstrengung ohne Stock gehen, schmerzlos Beugebewegungen bis zum spitzen Winkel ausführen, wenn auch nicht so weit als links. Der Umfang des Kniegelenks ist vom linken erheblich nicht abweichend, Haut nicht geröthet, die Condylen des Ober- und Unterschenkels sind deutlich sichtbar und fühlbar.

ste Massen im Gelenk sind sicher nicht nachweisbar, ebensowenig ein Erguss; die Patella liegt unmittelbar auf dem Knochen, seitwärts leicht verschiebbar, nicht aber in vertikaler Richtung.

Die Anzahl der exstirpierten Fremdkörper konnte nicht genau festgestellt werden, da eine grosse Anzahl der kleineren während der Operation verloren ging, es mögen aber sicherlich gegen 100 gewesen sein. Die Form der Gelenkkörper ist eine mannigfaltige. Theils haben sie eine sehr regelmässige Gestalt, sind oval, rundlich oder auch geradezu kugelförmig, theils haben sie eine mehr unregelmässige Form mit vielen Flächen und Kanten. Die platten oder richtiger konkav-konvexen Fremdkörper haben entweder im Ganzen eine mehr rauhe Oberfläche oder sind auf der einen Seite glatt und auf der anderen höckerig, uneben. Ihre Grösse variiert von der einer Erbse bis fast zu Patellagrösse. Die kleineren unteren haben constant einen zum Theil sehr beträchtlichen, dicken bindegewebigen Ueberzug, der hier und da in einen kurzen Stumpf endet; letzterer ist offenbar der Rest des Stieles mit dem der Fremdkörper dem Gelenkinnern anhaftete. Die grösseren haben wohl auch eine bindegewebige Hülle, doch ist sie nur dünn, straff, bläulich glänzend und lässt sich von ihr umschlossenen Kern durchscheinen; aber weitaus die Mehrzahl der grösseren Gelenkkörper ist nur auf einer Seite von Bindegewebe bekleidet; da wo sie uneben und höckerig sind, entbehren sie des Ueberzuges vollständig. Hier ist auch die Farbe der Gelenkkörper eine andere. Während sie nämlich unter dem Bindegewebsüberzuge kreideweiss ist, so ist das kalktem Gewebe ähnlich, ist sie an den unbedeckten Partien mehr gelblich, dem markhaltigen Knochengewebe ähnlich; diese Partien sind auch saftreicher, wie man dies leicht beim Durchschneiden der Körper bemerkt; die gelben Stellen setzen dem Messer einen weit geringeren Widerstand entgegen als die weissen. Aber auch in der Tiefe findet sich dieser Farbenunterschied, wie die Betrachtung des Durchschnittes lehrt. Hier wechseln hier die gelblich gefärbten Stellen mit den weissen mehr oder weniger unregelmässig ab. — Der mikroskopische Befund entspricht genau dem makroskopischen Aussehen. Es zeigt sich, dass der Grundstock aus Knochentextur, theilweise auch markhaltigem Knochengewebe gebildet wird, der Ueberzug dagegen aus zellenreichem Faserknorpel besteht.

Was die Frage nach der Entstehung der in Rede stehenden Gebilde betrifft, so ist es das Wahrscheinlichste, dass sie durch Wucherungen der Synovialis entstanden sind (nicht Einstülpungen im Sinne von Blandin's Lehre), sei es in Folge einer eigenthümlichen Disposition der letzteren — nach Analogie der arthritidis nodosa — sei es in Folge einmaliger oder wiederholter traumatischer Reizungen derselben mit oder ohne Bluterguss.

Möglicher Weise haben auch beide Faktoren zusammengewirkt; denn es ist bei einem Grubenarbeiter an gelegentlichen Traumen nicht fehlen können, ist einleuchtend, dass es sich aber auch um eine Idiosynkrasie handelt, das beweist das Knarren auch anderer Gelenke bei Bewegung.

Klinisch interessant ist, dass Patient trotz der Schwere der Erkrankung noch verhältnissmässig viel leisten konnte. Das Gehvermögen nur wenig beeinträchtigt; ja Patient hat, wie wir oben gesehen haben, bis zu seiner Aufnahme in's Lazareth noch in der Grube gearbeitet.

An diesen Fall möchte ich zur vergleichenden Uebersicht Fälle von multiplen, operativ entfernten Gelenkkörpern aus der Literatur anreihen.

Die grösste Zahl von Gelenkkörpern ist wohl von Santesson beobachtet worden. S. entfernte aus dem Kniegelenk eines 36 Jahre alten Mädchens, das stets schwere Arbeiten geleistet und viel geschneuert, 91 freie Körper und liess ausserdem noch 3 grössere gestielte im Gelenk zurück, da deren Entfernung inopportun erschien. Key, der den grossen Theil der Gelenkkörper untersuchte, glaubte, dass das die Gelenke reichende theilweise verkalkten Chondrome ausgegangen seien von ausserhalb der Kapsel gelegenen Theilen, dem Knorpel und dem Periost, nicht von den Fransen der Synovialis. Die Verkalkung schritt von den innersten Zellen nach aussen fort; bei einzelnen war auch ein Rest eines bleibsel von einem früheren Stiel. Virchow giebt als die grösste Zahl, die er gesehen hat, etwas über 60 freie an und eine gewisse Anzahl angewachsener, die er einmal in einem Kniegelenk fand⁴⁰); Morgagni beschreibt ihrer etwa 26, Haller aus dem Kiefergelenk 20. Köhler⁴²) operierte einen 51jährigen Klempner, in dessen rechem Schultergelenk sich 54 Gelenkmausse vorfanden. Dieselben lagen zum kleinsten Theil frei im Gelenk, sondern steckten so in der Kapsel, dass man sich mindestens die eine Hälfte des Volumens extrakapsulär beseitigen musste. Bei der Extraction der Körper musste der Gelenkkopf reseziert werden. Derselbe zeigte die ausgesprochenen Kennzeichen der deformirenden Gelenkentzündung. Am auffallendsten war der Umstand, dass die Zahl und Zahl der Gelenkkörper eine so enorme war, dass die Circulation der Art. axill. nach dem Arm dadurch fast völlig aufgehoben wurde. Ein Umstand, der sich darin kennzeichnete, dass an dem dick geschwollenen, livid verfärbten Arme der Radialpuls nicht zu fühlen war. Das Schultergelenk hatte vor der Operation Mannskopfgrösse und gab beim Palpieren für den Untersuchenden das Gefühl, als drücke man auf einen Sack voll Wallnüsse.

Henrtaux⁴³) extrahierte einem Manne mit glücklichem Resultat 35 Gelenkkörper aus dem linken Kniegelenk. Es handelte sich um

³⁹) Hygiea XLI 3. 4.

⁴⁰) Geschwulstlehre Bd. I S. 54.

⁴¹) Gurlt l. c. S. 114.

⁴²) Berl. klin. Wochenschr. 1884 No. 23 und Centr. Blatt für 1885 No. 15.

⁴³) Virchow-Hirsch Jahresber. XVI 1882.

ährigen Mann, der 10 Jahre früher einen heftigen Schlag gegen das Kniegelenk erhalten hatte. Es folgte damals eine heftige Entzündung, die zur Bildung eines Abscesses führte, der eröffnet wurde und endlich Eiter entleerte. Darnach blieb immer eine erhebliche Anschwellung des Knies bestehen. Vor 2 Jahren that Patient einen heftigen Sturz auf das Knie, wonach erhebliche Anschwellung eintrat, die allmählich zunahm und die Funktion des Kniegelenks behinderte. Januar 1880 — Operation; Heilung per primam, functionell gutes Resultat. ⁴⁴⁾

Barwell entfernte aus dem Ellenbogengelenk eines Matrosen Gelenkkörper, Berký aus dem Kniegelenk eines Negers 30 Körper. Einen sehr bemerkenswerthen Fall theilt Eugen Boeckel ⁴⁵⁾ mit. Er entfernte aus dem Metakarpo — Phalangealgelenk des Mittelfingers eines 54jährigen kräftigen Manne 7 kleine Gelenkkörperchen, die offenbar aus Wucherungen der Synovialzotten entstanden und zum Theil vollständig, zum Theil nur in der Mitte verkalkt waren.

Fälle, in denen wohl einige, aber bei weitem nicht eine so grosse Menge von Gelenkkörpern exstirpiert worden ist, sind sehr zahlreich. ⁴⁶⁾

⁴⁴⁾ Bull. de la Soc. de Chir. 16 Fevr.

⁴⁵⁾ Gaz. des. hôp. 20. 1876.

⁴⁶⁾ cfr. v. Fillenbaum, Militairarzt XV 12. Gutsch Arch. f. Klin. Chir. XXV p. 945. 1880. Schüssler Berl. Klin. Wochenschr. XVII 39. 1880.



Lebenslauf.

Verfasser, Sohn des zu Georgenberg Kr. Tarnowitz verstorbenen Kaufmanns J. Riesenfeld, jüdischer Konfession, ist am 12. April 1862 geboren. Er trat im October 1871 in das Gymnasium zu Beuthen O.-S. ein und verliess dasselbe im August 1880 mit dem Zeugnis der Reife. Im October desselben Jahres wurde er bei der medicinischen Facultät in Breslau immatriculirt, bestand im December 1882 die medicinische Vorprüfung und im Wintersemester 1884/85 das medicinische Staatsexamen.

Im August 1885 liess er sich als Arzt in Woischnik Kr. Lublinitz nieder, legte im October 1886 das tent. rigorosum in Breslau ab, siedelte im Januar 1887 nach Ujest Kr. Gross-Strehlitz über und practiciert nun seit August dieses Jahres in Freystadt N.-Schl.

Während seiner Studienzeit besuchte er die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

Berger, Biermer, Buchwald, F. Cohn, H. Cohn, Fischer, Foerster, Fritsch, Gierke, Gottstein, Haeser, Hasse, Heidenhain, Joseph, Loewig, Meyer, Neumann, Neisser, Ponfick, Richter, Soltmann.

Allen diesen hochgeehrten Herren spricht Verfasser hiermit seinen herzlichsten Dank aus.

